Correction TP

**Dynamique des zones de
convergence -
*les zones de subduction***

Act les marqueurs de la subduction

- ▶ Le magmatisme des zones de subduction

Le magmatisme des zones de subduction

La répartition mondiale des volcans

Problème

Quelle est l'origine des alignements volcaniques parallèles aux fosses océaniques sur le bord de la plaque chevauchante ?

Quelles roches sont formées dans ces zones ?

1) Les caractéristiques du magmatisme de subduction

https://youtu.be/aVqC1nBjl_o

https://youtu.be/dY_3ggKg0Bc

Le Mont St-Helens (États-Unis, 1980)

<http://www.visite-usa.fr/parcs/helens.htm>

Le Mont St-Helens (États-Unis, 1980)

Au moment de l'explosion : 18 mai 1980 (8h32)

Après l'explosion

57 morts, 380 km² de forêts remplacés par des collines arides

Avant et ... après

Volcan Mérapi (île de Java, Indonésie, 2010)

Un volcanisme explosif et destructeur (343 morts)

Une nuée ardente

Avalanche de fragments solides (scories, cendres) de gaz et de vapeur d'eau

400°C

300 à 400 km/h

Après l'éruption

Des roches plutoniques en profondeur

Une zone avec un relief particulier

Bloc diagramme
correspondant au profil AB (L=5061 km)

Une zone montagneuse avec un volcanisme explosif

<https://youtu.be/slLvsrU9dbk>

- des séismes
 - superficiels
 - moyens
 - profonds

alignés sur un plan qui plonge sous l'amérique du sud

Coupe légendée.

En 3D

Données thermiques

Interprétation et histoire des sciences

- ▶ RAPPEL : étude de la propagation des ondes sismiques
- ▶ En 1964, trois sismologues américains, Jack Oliver, Bryan Isacks et Lynn Sykes, examinent l'activité sismique au niveau de la fosse des îles Tonga, dans le Pacifique sud
- ▶ Ils enregistrent les ondes sismiques produites par un séisme profond dont l'épicentre se trouve à égale distance des stations sismiques Fidji et Tonga (voir ci-contre). Ils observent que les ondes P parviennent deux secondes plus tôt à la station Tonga qu'à la station Fidji.

Lors de l'enregistrement des ondes d'un **séisme profond** dont l'épicentre E est situé à égale distance de 2 stations d'enregistrement (**Fidji et Tonga**), on constate que les ondes P arrivent 2 sec. **plus tard** à la station Fidji qu'à la station Tonga.

- Aides ou « coup de pouces » : pour retrouver la relation entre les données sismiques de 1964 et les données tomographiques

L'anomalie positive de vitesse des ondes parcourant le trajet F → Tonga est interprétée par l'existence d'un matériau **froid et dense** (lithosphère océanique) qui plonge par **subduction** dans l'asthénosphère plus ductile.

- ▶ -RAPPEL : la tomographie sismique.
- ▶ La tomographie sismique permet de cartographier des régions du manteau où la vitesse des ondes sismiques est anormale par rapport à la propagation moyenne. La densité des matériaux dépend de la température. La vitesse de propagation des ondes est inférieure dans un matériau peu dense et est supérieure dans un matériau dense. Les écarts, exprimés en pourcentage, traduisent des variations importantes de température. On associe les régions où les vitesses sont lentes aux régions chaudes; celles où les vitesses des ondes sont rapides aux régions froides.

D'après Zhao et al., 1997

Idem vu en coupe. Image obtenue en 1997 par le traitement d'environ 926 séismes.

La forme **bleue** correspond à des anomalies de vitesse positives, supérieures à +1.5%.
La forme **rouge** correspond à des anomalies de vitesse négatives, inférieures à -2%.

Profil tomographique 3D correspondant au profil AB (L=1897 km)

Du fait de la perspective, aucune échelle verticale n'est proposée pour les coupes en 3D. Pour avoir accès à l'échelle verticale, utilisez le mode "Coupes en 2D" dans les options.

Attention : l'échelle radiale (verticale) est exagérée 16.6 fois, jusqu'à 9 km de profondeur.

Interprétations du doc du livre /attention au sens de la subduction par rapport à l'exemple d'avant

Ligne virtuelle reliant les foyers des séismes.

b

un séisme nécessitant un milieu cassant, ce plan matérialise **le plongement d'un matériel froid et cassant, le long duquel se sont déroulés les séismes** : le plongement de la plaque Nazca, dense et froide sous la plaque d'Amérique du Sud

Conclusion :

- ▶ On observe au niveau d'une zone de subduction, une tomographie sismique particulière mettant en évidence la plongée d'une lithosphère sous un autre :
- ★ Sous la plaque chevauchante, on observe une zone **d'accélération** des ondes sismiques qui s'enfonce obliquement (bleu), témoin d'un matériau plus **dense** et **froid** plongeant dans l'asthénosphère
- ★ Au-dessus de ce plongement, on observe un **ralentissement** des ondes (rouge) témoin d'un matériau moins **dense** et plus **chaud** = le **magmatisme** des zones de subduction.
- ▶ Des foyers de séismes y sont de plus en plus **profonds** le long d'un **plan** (Wadati- Benioff) représentant la LO qui plonge.
- ▶ Enfin, la **bathymétrie** et le **flux géothermique** y sont particuliers également : au niveau de la fosse, la profondeur peut atteindre les 11 km et le flux thermique est plus **bas** que la moyenne sur Terre (40 mW.m⁻² au lieu de 60 mW.m⁻² en moyenne).

Activité 2 : Les roches des zones de subduction

Étude des roches des zones de subduction - granodiorite

Diorite

Composition chimique

Silice	Alumine	Alcalins
66 %	15 %	6 %
Calcium	Fer	Magnésium
4,5 %	5,3 %	2,2 %

HBV = amphibole (hornblende)
Pl = feldspath plagioclase

Synthèse granodiorite

- ▶ **La granodiorite** : structure grenue (= phénocristaux jointifs.)
- roche magmatique plutonique provenant d'un refroidissement lent en profondeur du magma.
- Les édifices mis en place sont des plutons.

andésite

Synthèse andésite

- ▶ **L'andésite** : structure microlitique (=verre non cristallisé, microlites(plagioclases) et quelques phénocristaux (plagioclases, pyroxène, amphibole).
- roche magmatique volcanique provenant d'un refroidissement rapide du magma.
- Les édifices mis en place sont des volcans.

L'Andésite

Au niveau de l'arc volcanique, une quantité importante de lave visqueuse est produite à chaque éruption. Le refroidissement en surface de ces laves engendre la formation d'une grande diversité de roches qualifiées de volcaniques. Parmi celles-ci, l'andésite et la rhyolite sont caractéristiques des zones de subduction.

Bordas, Terminales S, 2012

amphibole
hornblende brune
pâte formée de microlithes de
pyroxènes, amp, plagio, biotites
plagioclase
biotite
pyroxène

image en LPNA en haut
image en LPA en bas

plagioclase
pâte formée de microlithes de
pyroxènes, amp, plagio, biotites

<http://svtlarde.pagesperso-orange.fr/page%2031%20fiche%20g%E9ol.htm>

<http://svtlarde.pagesperso-orange.fr/page%2031%20fiche%20g%E9ol.htm>

L'andésite

- Roche magmatique volcanique
- Structure microlitique
- Composition minéralogique :
 - phénocristaux de plagioclases, d'amphiboles, de pyroxènes, de biotite ;
 - microlites d'amphiboles et de plagioclases ;
 - verre (partie non cristallisée).

Bordas, Terminales S, 2012

La rhyolite

La granite

noir : biotite
blanc : plagioclases
rose : orthose
gris : quartz

Le granite est le résultat du refroidissement de poches de magma formant des plutons retenus en profondeur. Ces derniers finissent par affleurer suite à l'érosion décapant les roches sus-jacentes.

Par opposition, les roches volcaniques sont le résultat de la remontée en surface des magmas. La rhyolite est l'équivalent volcanique du granite.

Doc. 1 -Lame mince de rhyolite

Doc. 2-Lame mince de granite

Roches	Aspect à l'œil nu	Minéraux présents	Texture
Andésite	roche assez homogène, de couleur gris moyen, d'aspect mat, avec quelques cristaux noirs et blancs	Verre Microlites de forme allongée Plagioclases Amphiboles	Microli tique
Rhyolite	roche hétérogène avec de nombreux cristaux clairs noyés dans un verre de couleur rose foncé à grenat	Verre Microlites en forme de grains Quartz (gros cristaux) Plagioclases (assez rares) Mica noir (= biotite, assez rare)	Microli tique
Granite	roche brillante de couleur blanc-crème tacheté de noir	Quartz Plagioclases Mica noir (= biotite)	Grenue
Diorite	roche brillante constituée de cristaux noirs et blancs en proportions équivalentes	Plagioclases Amphiboles Quartz (rare) Mica noir (= biotite, rare)	Grenue

Grâce à vos connaissances, expliquez les différences de textures observées.

Les roches volcaniques (andésite, rhyolite) ont une texture microlitique car elles se sont refroidies rapidement en surface. Les roches plutoniques (granite, diorite) se sont refroidies lentement en profondeur, elles ont une texture grenue

Composition minéralogique des roches plutoniques des zones de subduction (en %)

	Granite (ou rhyolite*)	Diorite (ou andésite*)	Basalte (pour comparaison)
Quartz	30,5	-	-
Orthose	35,5	-	-
Plagioclases	14	60	50
Biotite, muscovite	10	5	-
Pyroxènes	-	12	25 à 40
Amphiboles	8	20	-
Olivine (péridot)	-	-	10 à 25
Magnétite (Fe ₃ O ₄)	-	-	2 à 3

* Rhyolite et andésite présentent respectivement les mêmes minéraux que granite et diorite, mais sous forme de phénocristaux noyés dans du verre.

Composition chimique en oxydes (en %)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO MgO	Na ₂ O K ₂ O	CaO	H ₂ O
Quartz	100	0	0	0	0	0
Orthose	66,67	11,11	0	22,22	0	0
Plagioclases	50,35	33,23	0	4,12	11,67	0
Biotite	35,3	5,88	35,3	11,76	0	11,76
Muscovite	46,1	23,1	0	15,4	0	15,4
Pyroxènes	50	0	50	0	0	0
Amphiboles	50	0	43,75	0	0	1,25

Formules chimiques des principaux minéraux

- Quartz : SiO₂
- Feldspath, orthose : KAlSi₃O₈
- Plagioclases : CaAl₂Si₂O₈ ; NaAlSi₃O₈
- Biotite (mica noir) : K(Fe,Mg)₃AlSi₃O₁₀(OH)₂
- Muscovite (mica blanc) : KAl₂(AlSi₃O₁₀)(OH)₂
- Pyroxènes : Ca(Fe,Mg)Si₂O₆
- Amphiboles : NaCa₂(Mg,Fe,Al)₅[(Si,Al)₈O₂₂](OH)₂

Doc. 3 Des roches riches en minéraux hydroxylés.

Bilan :

- ▶ Tous les minéraux des roches magmatiques ne sont pas hydratés (exemple : le quartz) mais la plupart le sont comme la muscovite par exemple ; l'hydratation résulte de la présence de radicaux type radicaux hydroxyles (OH-)
- ▶ On peut en déduire que les roches magmatiques proviennent d'un magma hydraté.

Activité 3 : la formation des magmas dans les zones de subduction .

Analyse du Doc.

- ▶ **Rappels** :
- ▶ **Géotherme**: courbe qui indique la T en fonction de la P en un point du globe
- ▶ **Solidus**: droite ou courbe expérimentale qui sépare un domaine où les roches sont solides d'un domaine où les roches sont solide + liquide.
- ▶ **Liquidus**: sépare un domaine où les roches sont partiellement fondues d'un domaine 100% liquide.
- ▶ **Comment expliquer alors la fusion partielle à l'origine du volcanisme dans une zone de subduction ?**

Sur l'image de tomographie sismique, localisez la zone de production du magma et nommez la roche qui subit la fusion partielle.

Document 1 page 220

Sur l'image de tomographie sismique, localisez la zone de production du magma et nommez la roche qui subit la fusion partielle.

Une zone anormalement chaude (caractérisée par un ralentissement des ondes P) est présente sous l'arc volcanique et au-dessus des séismes répartis selon le plan de Wadati-Benioff. Le magma se forme donc dans le manteau de la plaque chevauchante vers 100 km de profondeur. **Cette zone, nommée "coin de manteau" est constituée de péridotite qui doit donc subir une fusion partielle.**

(étonnant !!! quand on pense qu'elle est en contact avec la croûte océanique froide de la plaque plongeante ???)

Et pourquoi les péridotites sont-elles hydratées ???

Rappel: quelques réactions métamorphiques de quelques minéraux

Plagioclase + Hornblende + eau → Chlorite + Actinote

Albite + Chlorite + Actinote → Glaucophane + eau

Albite + Glaucophane → Grenat + Jadeite + eau

<i>Facies</i>	<i>Minéraux caractéristiques</i>	<i>Hydroxyles*</i>
Schistes verts (SV)	Actinote, chlorite	oui
Schistes bleus (SB)	Glaucophane	non
Eclogites (Ec)	Grenat, jadeite	non

** l'eau peut-être présente dans les minéraux sous forme de radicaux hydroxyle (OH). On parle de minéraux hydroxylés*

Comment les péridotites sont-elles hydratées ?

- ▶ La plongée de la lithosphère océanique, entraînant des transformations minéralogiques liées à l'augmentation de pression (SV → SB → Ec) provoque une **déshydratation** des minéraux des roches types schistes verts, schistes bleus et **libération d'eau**, de qui entraîne une **hydratation des péridotites situées au-dessus de plan de Benioff**.

Manteau chevachant

- A** 800 °C/80 km
- B** 900 °C/100 km
- C** 1 000 °C/120 km

Croûte océanique

- D** 400 °C/150 km

Manteau plongeant

- E** 400 °C/180 km
- F** 600 °C/200 km
- G** 800 °C/220 km

Profondeur
(en km)

— Isothermes

La fusion partielle de la péridotite du coin de manteau de la plaque chevauchante

Que constatez-vous ? A quelles conditions, la fusion partielle de la péridotite est-elle possible ?

Le géotherme de subduction montre que la fusion d'une péridotite anhydre (sèche) est impossible car le géotherme ne recoupe pas le solidus. Par contre, il recoupe le solidus hydraté entre 80 et 120 km de profondeur, ce qui permet une fusion partielle de la péridotite à ces profondeurs. La péridotite ne pourra donc subir un début de fusion que si elle contient de l'eau.

Origine de la diversité des roches: la composition chimique

Composition chimique des basaltes des dorsales, des basaltes de subduction, des andésites et rhyolites

	SiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO	oxydes de Fe	Al ₂ O ₃	H ₂ O
Basalte des dorsales	47 %	0,2 %	2,2 %	11 %	8,5 %	9,4 %	15,8 %	—
Basalte des zones de subduction	50 %	0,5 %	2,6 %	10,7 %	5 %	10 %	18 %	1,5 %
Andésite	54,2 %	1,1 %	3,7 %	7,9 %	4,4 %	9 %	17,2 %	1,2 %
Rhyolite	73,7 %	5,3 %	3 %	1 %	0,3 %	1,7 %	13,4 %	1,9 %

→ Augmentation de la viscosité avec l'augmentation du % de silice.

Refroidissement lent/rapide/ roche plutonique/volcanique

R. VOLC
R. PLUT

roches plutoniques grenues
roches volcaniques microlitiques

Document 3B page 221

Document 3 page 221

Grâce aux données fournies par ce document, expliquez la variété des roches magmatiques produites dans les zones de subduction.

Lors de son refroidissement, le magma produit par la fusion de la péridotite hydratée subit une cristallisation fractionnée. Les minéraux les plus pauvres en silice cristallisent en premier (olivine, pyroxène), le magma résiduel devient donc plus riche en silice.

En remontant dans la croûte de la plaque chevauchante, le magma peut faire fondre en partie les roches de cette croûte ce qui modifiera sa composition.

Bilan

Dans les zones de subduction, la production de magma résulte de la fusion partielle de la péridotite du coin de manteau de la plaque chevauchante, à condition que cette péridotite soit hydratée.

La plus grande partie du magma se refroidit lentement et cristallise en profondeur pour former roches plutoniques à texture grenue (diorite, granite). Le magma qui remonte vers la surface se refroidit plus rapidement et forme des roches volcaniques à texture microlitique (andésite, rhyolite).

La cristallisation fractionnée du magma et l'incorporation de constituants de la croûte au cours de sa remontée permet de former des roches magmatiques variées.

Correction du trajet subi par le gabbro (en rouge)

Le bilan en schéma ...

Schéma bilan complété