

Patient et
Contacts
proches



TRAITEMENT PAR VOIE ORALE

STROMEKTOL® (ivermectine)

Boîte de 4 comprimés dosés à 3 mg d'ivermectine.

Contre-indication : poids du patient < 15 kg, à éviter chez la femme enceinte.

Une 2ème prise, une semaine plus tard, est recommandée par le Haut Conseil de la Santé Publique.

S'administre en une prise à jeun avec de l'eau : pas d'alimentation 2h avant et après la prise

Une exacerbation du prurit est possible dans les jours suivants la prise du traitement.

Poids	Dose (mg)	Nb de comprimés
15-24	3	1
25-35	6	2
36-50	9	3
51-65	12	4
66-79	15	5 (2 boîtes)
≥80	18	6 (2 boîtes)

TRAITEMENTS LOCAUX

TOPISCAB® (perméthrine)

ASCABIOL® 10% émulsion
(benzoate de benzyle)

Traitement local, utilisable chez l'enfant à partir de 1 mois et chez la femme enceinte.

2 flacons sont nécessaires pour un traitement complet.

Forme	Emulsion
Composition	Benzoate de benzyle
Posologie	2 applications à 8j d'intervalle

S'applique le soir sur tout le corps (éviter le visage), en 2 couches successives à 10 min d'intervalle pour laisser sécher le produit. Laisser agir 24 h. Une 2ème application est nécessaire 1 semaine plus tard.

Femmes enceintes : une seule couche et laisser agir 24h.

Enfants < 2 ans : une seule couche et laisser agir 12h.

TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES

Traitements complémentaires pouvant être retrouvés sur une ordonnance de gale :

- Traitements symptomatiques contre le prurit : crotamiton (crème), chlorhydrate de quinisocaïne (crème), etc..
- Antihistaminiques locaux et/ou oraux.
- Dermocorticoïdes à appliquer 24 h après le traitement anti-scabieux pour éviter d'aggraver la gale.
- Gale infectée : traitement par antibiothérapie.

Traitement local en crème, utilisable chez l'enfant à partir de 2 mois et chez la femme enceinte.

Adultes, enfants de plus de 12 ans	Un tube de 30g (2 tubes max.)
Enfants de 6 à 12 ans	Jusqu'à 1/2 tube (15g)
Enfants de 1 à 5 ans	Jusqu'à 1/4 tube (7,5g)
Enfants de 2 mois à 1 an	Jusqu'à 1/8 tube (3,75g)

S'applique le soir sur tout le corps (éviter le visage). Ne se rince que le lendemain matin, 8 heures après l'application. Une 2ème application est nécessaire une semaine plus tard.

Effets indésirables des traitements locaux : picotements et irritations cutanées dans les jours suivant l'application.

Linge

Concerne toute les formes de gale : commune et profuse. Nettoyer à 60°C en machine le linge (vêtements, draps, peluches...) utilisé par les personnes du domicile, depuis moins de 3 jours (8 jours pour les gales profuses).

Pour le linge qui ne peut être lavé à 60°C, le placer en quarantaine dans un sac plastique : 3 jours (gale commune) à 8 jours (gale profuse) à température ambiante, ou 4h avec un acaricide (type APAR®).

Environnement

Il est indiqué dans certains cas (gales profuses, plusieurs cas dans une même famille, répétitions d'épisodes...) et doit être réalisé dans les 12h suivant le traitement médicamenteux.

Exemple : avec la prise du traitement au coucher, la désinfection peut s'effectuer le lendemain matin.

Tout le mobilier constitué de matériaux absorbants doit être traité avec l'acaricide : canapés, couvertures, oreillers, matelas, peluches, etc. Attendre 12 h avant de réutiliser la literie désinfectée.

Ouvrir les fenêtres lors de l'utilisation d'un acaricide pour éviter une irritation des voies aériennes, et ne pas utiliser le produit à proximité d'un asthmatique. Les produits acaricides ne doivent pas être manipulés par ou en présence d'une personne asthmatique.