

# Um esboço sobre os melhores

tratamentos da próstata aumentada A primeira pergunta que você deve fazer quando se trata do tratamento da próstata aumentada é se você deve ou não curar a situação. Se você quer curar o problema da sua próstata, então você deve ir online e [Comprar Avodart Portugal](#).

Quando a situação foi analisada por seu médico especialista (uma etapa vital para confirmar que as indicações que você enfrenta são devido a uma próstata aumentada e não a qualquer outra coisa), você precisaria tomar uma decisão se a situação o irrita ou não . Caso não seja, então, para alguns homens, a resposta não é curá-la de forma alguma, mas apenas deixar seu médico verificar a situação para você por alguns meses.



Porém, se você está preocupado com os sintomas da próstata ou se o seu médico especialista achar que existe o perigo de desenvolver problemas decorrentes desse problema, o tratamento para o aumento da próstata deve ser necessário.

A primeira linha de defesa será o tratamento medicamentoso ou para **Comprar Dutasteride** e há muitos medicamentos em uso agora e alguns outros em desenvolvimento e testes ativos. No geral, o tratamento médico não curaria a situação, mas pode aliviar completamente os sinais de inflamação da próstata. Você precisaria conversar sobre o tratamento medicamentoso com seu médico, pois alguns pacientes na faixa etária para a qual o problema de aumento da próstata é comum já estarão em tratamento médico para algumas outras situações. O seu médico especialista irá até falar sobre a gama de possíveis efeitos colaterais que os remédios para o tratamento da próstata aumentada trazem com eles. Caso não encontre o tratamento adequado para curar o seu problema, deve consultar o seu médico ou optar pela [Reduza a próstata com Avodart Dutasteride](#).

Caso você não se sinta adequado para o tratamento medicamentoso (ou o seu médico não ache que o tratamento medicamentoso seria bom em seu caso em particular), outro passo é lembrar-se de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Existem muitos procedimentos disponíveis agora, alguns dos quais podem ser iniciados com base no

paciente-dia e alguns dos quais necessitariam de uma curta permanência no hospital. Em alguns casos, uma cirurgia ligeiramente invasiva é planejada para reduzir a glândula da próstata ou eliminar o tecido da próstata da parte ao redor da uretra e assim facilitar o aperto na uretra e restabelecer o fluxo de urina da bexiga.



Caso esses tipos de tratamento não sejam apropriados ou tenham sido comprovados e julgados ineficazes, o tratamento da próstata aumentada passará para o tratamento cirúrgico. Duas operações normalmente realizadas são a TUIP e a TURP, ambas podem ser realizadas por laparoscopia ou com a ajuda de tecnologia de robô e precisam de uma internação de 2 a 3 dias. Em alguns outros casos, e principalmente quando a próstata está excepcionalmente aumentada, a cirurgia aberta desatualizada pode ser executada com hospitalização durando principalmente cerca de uma semana.